



GASTROPANEL

SCREENING NON INVASIVO PER LA DIAGNOSI DI PATOLOGIE GASTRICHE

REV.1 DEL 29/03/2017

Il **GASTROPANEL** è un test clinico non invasivo per la diagnosi precoce dei disturbi dello stomaco.

L'esame si effettua a partire da un prelievo di sangue eseguito a digiuno (*) (almeno da 4- 5-6 ore, preferibilmente da 8 - 10 ore) e si basa sulla determinazione di un pannello di 4 dosaggi:

- Anticorpi anti Helicobacter pylori
- Pepsinogeno I
- Pepsinogeno II
- Gastrina 17

L'elaborazione di un algoritmo permette di valutare i risultati dei 4 marcatori per stabilire la causa dei disturbi (infezione da Helicobacter pylori, Gastrite atrofica o d'altra natura, iper/ipo-acidità, dispepsie d'altra causa...)

Il Gastropanel è un test di screening consigliato a tutti i soggetti affetti da disturbi gastrici (dolori, bruciori, nausea, inappetenza, etc...) e sindromi da malassorbimento, in particolar modo bambini o anziani, pazienti trattati con farmaci potenzialmente gastrolesivi, soggetti con familiarità per cancro gastrico e patologie autoimmuni del tubo digerente.

Eventuali risultati positivi possono essere sufficientemente esaustivi per talune diagnosi o talvolta suggerire la necessità di ulteriori indagini cliniche o strumentali, tra cui la gastroscopia. Quest'ultima resta l'esame di riferimento principale per le patologie gastriche, ma dato il suo carattere invasivo, grazie al Gastropanel, si può notevolmente ridurre il numero di casi per quali sia strettamente necessario.

ATTENZIONE:

alcune terapie farmacologiche possono influire sui risultati del test, tuttavia **NON SOSPENDERE** le terapie **SENZA** aver prima **COSULTATO il MEDICO CURANTE**.

I seguenti farmaci **possono interferire significativamente fino ad una settimana di distanza**: medicine che inibiscono la secrezione di acido gastrico, ranitidine (Esophex, Inside Brus, Ranicur, Ranil, Ranimex, Ranitidin, Ranitidine, Ranixal, Zantac), famotidine (Famotidin, Pepcid, Pepcidin, Pepcid Duo), nizatidine (Nizax), inibitori di pompa protonica (Pantoprazole, Esomeprazole, Rabeprazole, Lansoprazole Lanzo, Zolt, Losec, Omeprazol, Nexium, Pariet, Somac, Gasterix, Pantoloc, Giasemin, Panzor).

I seguenti farmaci o medicinali **possono interferire significativamente fino ad un giorno di distanza**: antasides (Balacid Novum, Gaviscon, Link, Magnesium milk, Novaluzid, Rennie) e protettori gastrici (Alsucral, Antepsin).

La Direzione