

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER L'ISTEROSALPINGOGRAFIA

REV.2 DEL 16/04/2015

Prima dell'isterosalpingografia la paziente deve fare un Tampone Vaginale per Micoplasma e Clamydia (i tamponi hanno validità di 30 giorni).

L'esito dei tamponi deve risultare negativo per poter procedere con l'isterosalpingografia.

Da quel momento è consigliabile avere rapporti sessuali protetti fino al giorno dell'esame.

Il primo giorno del ciclo mestruale successivo ai tamponi la paziente deve telefonare per prendere appuntamento per l'isterosalpingografia (si effettua tra 10°-13° giorno del ciclo).

Il giorno dell'esame deve presentarsi due ore prima dell'appuntamento, digiuna da 4 ore, al 1° piano (Accettazione Analisi Cliniche e Ritiro Referti), per effettuare un prelievo per l'analisi Beta-HCG.

La paziente deve assumere:

- 2 compresse di Buscopan la sera precedente l'esame ed eseguire una lavanda vaginale;
- 2 compresse di Buscopan la mattina dell'esame;
- 2 compressa di Buscopan 1 ora prima l'esecuzione dell'esame.

N.B.

Il giorno dell'esame la signora deve essere provvista:

- dell'esito dei tamponi eseguiti precedentemente;
- di due compresse di Buscopan, **da assumere un'ora prima dell'esame;**
- di un assorbente igienico esterno;
- **della richiesta del medico specialista.**

La Direzione