



ACCORGIMENTI DA SEGUIRE PRIMA DI EFFETTUARE IL PRELIEVO PER PSA TOTALE E PSA LIBERO PSA TOTALE E PSA LIBERO (FREE - PSA)

REV.2 DEL 20/12/2011

Nei sette giorni precedenti il prelievo venoso per eseguire il dosaggio sierico di PSA Totale e frazione libera NON sottoporsi a massaggio prostatico, esame rettale, ecografia trans-rettale, biopsia prostatica.

Inoltre, evitare attività sportiva intensa e soprattutto bicicletta o cyclette o spinning nei cinque giorni precedenti il prelievo venoso stesso.

POSSIBILI INTERFERENZE ESOGENE SUI LIVELLI DI:

- **BTA CA125 CA 19-9 TPA**
- **BTA (Bladder Tumor Antigen)**

Nei sette giorni precedenti la raccolta delle urine per il dosaggio del BTA non somministrare farmaci per via vescicale.

Sono stati osservati livelli elevati di BTA in soggetti con calcolosi renale, nefrite, traumi recenti della vescica o delle vie urinarie, tumori renali. Pertanto, la rilevazione della presenza di antigene del tumore vescicale (BTA) nelle urine non costituisce una prova assoluta del carcinoma della vescica.

CA 125

Aumenta nella endometriosi, nelle metrorragie e soprattutto durante il ciclo mestruale, per cui non è indice esclusivo di neoplasia dell'ovaio.

CA 19-9 (GICA)

Aumenta nelle patologie benigne dell'apparato digerente. Pertanto non è indice di neoplasia del sistema fegato-cistifellea, dello stomaco dell'intestino o di metastasi epatiche.

TPA

Aumenta nei processi infiammatori che interessano vari distretti dell'organismo, nel processo riparativo di ferite. Pertanto è un indice molto variabile di neoplasia.

Tempo massimo di risposta: 2 giorni

La Direzione