

## INDICAZIONI DA SEGUIRE PER L'ISTEROSALPINGOGRAFIA



### NOTA INFORMATIVA

Prima dell'Isterosalpingografia la paziente deve fare due tamponi cervicali, uno per Micoplasma e uno per Clamydia (i tamponi hanno validità di 30 giorni).

Appena avuto il risultato deve contattare il Cup chiedendo di poter parlare con il tecnico di radiologia all'interno 208 per comunicare l'esito dei tamponi.

L'esito dei tamponi deve risultare negativo per poter procedere con l'Isterosalpingografia. Da quel momento è consigliabile avere rapporti sessuali protetti fino al giorno dell'esame.

Il primo giorno del ciclo mestruale successivo ai tamponi la paziente deve telefonare per prendere appuntamento per l'Isterosalpingografia (si effettua tra 10°-13° giorno del ciclo).

### INDICAZIONI GENERALI

#### **Il giorno dell'esame**

Il primo giorno del ciclo successivo ai tamponi deve telefonare e prendere appuntamento per l'esame radiografico (si effettua tra il 10° ed il 13° giorno dall'inizio del ciclo).

Il giorno dell'esame deve presentarsi due ore prima dell'appuntamento a digiuno da 4 ore, al primo piano per fare il prelievo per BETA-HCG.

#### **La paziente deve assumere**

2 compresse di Buscopan la sera precedente l'esame ed eseguire una lavanda vaginale;  
2 compresse di Buscopan la mattina dell'esame;  
2 compressa di Buscopan 1 ora prima l'esecuzione dell'esame.

#### **N.B.**

La cliente deve salire al 2 piano Radiologia e consegnare il risultato dei tamponi, del test Beta HCG e la richiesta del ginecologo indispensabili per effettuare l'esame.

Il giorno dell'esame la signora deve essere provvista:dell'esito dei tamponi eseguiti precedentemente;

di due compresse di Buscopan, da assumere un'ora prima dell'esame;  
di un assorbente igienico esterno;  
della richiesta del medico specialista.

La Direzione